

CALIDAD DE VIDA Y NECESIDADES BUCALES PERCIBIDAS EN PERSONAS CON ANTECEDENTES DE CÁNCER ORAL, EN TULUÁ, VALLE DEL CAUCA

ESTUDIANTES:

Layla Arango Hadatty


Sebastián Aguirre Vallejo

Esp. Rehabilitación Oral UNICOC Cali

DIRECTORA:

Claudia Patricia Sánchez Arteaga

INTRODUCCIÓN




A nivel mundial, se estima que 476,125 pacientes fueron diagnosticados con cáncer oral en 2020.

El cáncer oral y orofaríngeo son el 8° cáncer más frecuente en los hombres



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Calidad de Vida



Oral Health Impact Profile (OHIP)


IMÁGENES TOMADAS De: Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médicas. Cáncer de Boca
Chavez Rivera A. C., Choy Zapata. Impacto de la salud oral en la calidad de vida (OHIP 14) en los pacientes que acuden a 2 centros de salud del departamento de Cajamarca en los meses de mayo-agosto de 2019.. Lima - Peru : Universidad Peruana Cayetano Heredia., 2020

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



¿Cómo perciben las personas con antecedentes de cáncer oral del municipio de Tuluá del periodo 2018 a 2021 su calidad de vida relacionada con salud oral y cuál es la necesidad de tratamiento en salud oral?

MARCO TEÓRICO



-
- (1) Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud oral basado en la encuesta OHIP - 14 de las personas con secuelas de ACV que acuden a los servicios de rehabilitación y terapia física de los hospitales del distrito de Chimbote, provincia Del Sant. Avila Torado Kezen. s.l. : Universidad Catolica Los Angeles Chimbote, 2019.
- (2) Ballesteros, H., De Vries, E., Duarte, A., Vargas, H. y Cotes, M. Impacto de la modificación de los factores de riesgo en la incidencia de cáncer de cavidad oral en Colombia al año 2050. s.l. : Revista Colombiana de Cancerología. 23, 4 (dic. 2019), 126-134, 2019.
- (3) Ministerio de Salud y Protección Social.,. IV Estudio de Salud de Bucal. Situación en Salud Bucal. Bogotá : Unión Temporal Sistemas Especializados de Información SEI S. A., 2014.
- (4) Arango-Vélez EF, Arroyave-Hoyos CL, Zuleta-Tobón JJ, Restrepo-Ceballos MV, Lopera-Upegui AJ, Zuluaga-Castellanos H, et al. Investigación de la eficacia y criterios de aprobación de los tratamientos con medicamentos para pacientes con cáncer: una revisión. s.l. : Iatreia. 2018 Jul-Sept;31(3): 284-293., 2018.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Identificar la calidad de vida relacionada con salud oral en pacientes del municipio de Tuluá con antecedentes de cáncer oral y la necesidad de tratamiento oral percibida en el periodo 2018 - 2021.

OBJETIVOS

Objetivos específicos

Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio.

Estimar la calidad de vida percibida relacionada con salud oral de la población con antecedentes de cáncer oral en el municipio de Tuluá- Valle del Cauca.

Estimar las necesidades percibidas de tratamiento en salud oral de la población con antecedentes de cáncer oral.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

- Estudio observacional descriptivo de corte transversal

Población y Muestra

- Población: pacientes con diagnóstico de cáncer, residentes de Tuluá: 2018 -2021
- Muestra inicial: 35 pacientes
- Participantes: 6 pacientes

Instrumentos

- Encuesta:
 - ✓ OHIP-14
 - ✓ Datos sociodemográficos
 - ✓ Necesidades salud oral

Localización Municipio de Tuluá



MATERIALES Y MÉTODOS



Criterios de inclusión


Pacientes que entre 2018 y 2021 tuvieron experiencia de cáncer oral

Residentes en el municipio de Tuluá.

Mayores de edad.

Que firmaron el consentimiento informado y permitieron la utilización de la información.

MATERIALES Y MÉTODOS



MATERIALES Y MÉTODOS

Incapacidad Física

¿Ha sido su dieta poco satisfactoria debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis?

¿Ha tenido que interrumpir comidas debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis?

Incapacidad Psicológica

¿Encuentra dificultad para relajarse debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis?

¿Se ha sentido avergonzado frente a otras personas por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

Incapacidad Social

¿Se ha sentido irritable con otras personas por problemas debidos a sus dientes, boca o prótesis?

¿Tiene dificultad para hacer sus trabajos habituales debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis?

Minusvalía

¿Ha sentido usted que su vida es, en general, menos satisfactoria, debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis?

¿Se ha sentido totalmente incapaz de funcionar debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis?

RESULTADOS





Figura 1. Flujograma de selección e inclusión de pacientes.

RESULTADOS

Caracterización sociodemográfica de participantes



Edad mínima fue de 26 años y la máxima de 82.
La edad promedio fue de 59,1 años

RESULTADOS

Clasificación según área

Área	Frecuencia	Porcentaje
Labios y comisura labial	3	9%
Paladar duro	6	17%
Suelo bucal y lengua móvil	26	74%
Total general	35	100%

Área que relaciona el diagnóstico.

Área relacionada en el diagnóstico	Frecuencia	Porcentaje
Paladar	6	17%
Amígdala lingual	5	14%
Glándula submaxilar	5	14%
Maxilar	5	14%
Lengua	3	9%
Boca	2	6%
Glándula salival	2	6%
Labio	2	6%
Glándula parótida	1	3%
Huesos cráneo y rostro	1	3%
Piso de la boca	1	3%
Tejido celular subcutáneo	1	3%
Tiroideo Derecho	1	3%
Total general	35	100%

Fuente. Elaboración propia, según datos de la Secretaría de Salud de Tuluá

RESULTADOS

Calidad de vida percibida relacionada con salud oral de la población con antecedentes de cáncer oral en el municipio de Tuluá- Valle del Cauca.






Tabla 1. Puntaje de resultados OHIP -14

Sexo	Edad	Estrato	Ocupación	Tipo de vivienda	Total prueba OHIP -14
Hombre	77	Estrato 5	Pensionado (a)	Propia	14
Mujer	50	Estrato 2	Desempleado (a)	Familiar	44
Mujer	36	Estrato 2	Ama de casa	Alquilada	12
Mujer	62	Estrato 2	Ama de casa	Alquilada	8
Mujer	77	Estrato 4	Ama de casa	Propia	6
Mujer	51	Estrato 2	Ama de casa	Alquilada	6

Fuente. Resultados según encuesta aplicada a pacientes con antecedentes de cáncer oral en el periodo comprendido entre 2018 a 2021 -Tuluá -Valle del Cauca.

RESULTADOS

Necesidades percibidas de tratamiento en salud oral de la población con antecedentes de cáncer oral.



DISCUSIÓN

Aguirre, Arango 2023

Tuluá

Se encontró un puntaje máximo de 44 de 56 posibles.

En general, para los 6 pacientes evaluados la calificación fue de 15 puntos → percepción positiva o favorable.

Posada, Palacio 2019

Medellín

Un poco más de la mitad fueron mujeres el 85%. Se encontró un puntaje promedio de 33.3 $\pm$ 36.7

Cuando se analizan las necesidades de tratamiento no supera el 25%

Chávez y Choy 2019

Perú

En su mayoría, el sexo femenino tenía una perspectiva más negativa que el masculino

Promedio 21.35 $\pm$ 8.25 (2)

Utsman *et al.* 2016

Costa Rica

Se encontró según los resultados de la prueba OHIP -14 que las mujeres reportan puntajes más altos (3).

- (1) Pena Traperó, B. La medición del Bienestar Social: una revisión crítica. s.l. : Estructura Económica Y Organización Económica Internacional. Universidad de Alcalá. Estudios de Economía Aplicados. Vol. 27-2 2009 pp:299-324, 2009.
- (2) Chavez Rivera A. C., Choy Zapata. Impacto de la salud oral en la calidad de vida (OHIP 14) en los pacientes que acuden a 2 centros de salud del departamento de Cajamarca en los meses de mayo-agosto de 2019. . Lima - Peru : Universidad Peruana Cayetano Heredia., 2020.
- (3) 27. Utsman, A. R, Padilla, G. M y Rodríguez, B. Uso de la versión en español del perfil de impacto en la Salud Oral-14 para evaluar el impacto del tratamiento dental en la calidad de vida relacionada a la salud oral entre costarricenses . s.l. : Revista Científica Odontológica, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, 2016, pp. 24-29, 2016.

CONCLUSIONES

Se evidenciaron diferencias sociodemográficas entre pacientes, se tuvo mayor participación de mujeres con un 83%, así mismo, pacientes con una edad mínima de 36 años y una máxima de 77, años.

Lo que sugiere que la enfermedad los pueda afectar en forma distinta según sus hábitos, ocupación e incluso condiciones de la vivienda.

CONCLUSIONES

Según los resultados consolidados de la prueba OHIP-14, partiendo del valor promedio para los seis pacientes de 15 puntos, se concluye que la percepción de calidad de vida es positiva, sin embargo, se debe aclarar el caso de una paciente de 50 años, en cuyo único caso la percepción es negativa, requiriendo según ella informa un tratamiento odontológico adicional.

CONCLUSIONES

En cuanto a las necesidades percibidas de tratamiento en salud oral de la población con antecedentes de cáncer oral, se encontró que el 100% de consultados manifestó necesidad de recibir tratamiento o rehabilitación, independiente si utiliza o no prótesis. Esto conlleva a concluir que se para mejorar calidad de vida, se requiere seguimiento a las necesidades orales de los pacientes con antecedentes de cáncer oral.

RECOMENDACIONES

Se requiere de seguimiento a la enfermedad, educación de hábitos saludables y acompañamiento psicosocial porque el cáncer como enfermedad genera alteraciones al estado de ánimo del paciente, así como problemas de inseguridad y autoestima.

Así mismo, el personal de salud, desde médicos generales como odontólogos de atención primaria, deben estar preparados y comprometidos para indagar sobre temas de salud oral, permitiendo identificar síntomas o señales que puedan estar asociados a un probable cáncer en la cavidad oral.



AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento a los pacientes participantes por acceder a responder a los instrumentos.

A la Secretaria de Salud de Tulúa y al Secretario de Salud Dr. Jhon Jairo Aguirre por su colaboración y disposición en el proceso del estudio en general.

A nuestros docentes por guía y acompañamiento permanente. Dr. Christian León, Dra. Claudia Sánchez, Dra. Alejandra Ordoñez, Dra. Adriana Jaramillo y Dr. Julián Tamayo.

GRACIAS

