

Introducción

El cáncer oral según la Organización Mundial de la Salud (OMS) abarca los desarrollados en la región labial, las mucosas orales, la lengua y la orofaringe.


La incidencia mundial de los cánceres orales está estimada en 4 casos por cada 100.000 personas.

Este tipo de cáncer genera alteraciones en la calidad de vida de quien la padece, afectando aspectos funcionales, estéticos y emocionales.

Cáncer oral



Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médicas. Cáncer de Boca




Objetivo

- Identificar la calidad de vida relacionada con salud oral en pacientes del municipio de Tuluá con antecedentes de cáncer oral y la necesidad de tratamiento oral percibida en el periodo 2018 - 2021.

Materiales y Métodos

Estudio observacional descriptivo con corte transversal.

La población universo corresponde a pacientes diagnosticados con cáncer oral, en el periodo de 2018 a 2021, según registró de la Secretaría de Salud de Tuluá.



Resultados

Se aplicó el instrumento a seis pacientes con diagnóstico confirmado; 5 mujeres, 1 hombre, en edades entre 33 a 77 años (ver tabla 1). Respecto al resultado del OHIP-14, el puntaje máximo fue de 44 puntos y el mínimo de 6. Según la escala del instrumento la puntuación oscila entre 0 y 56, a mayor cercanía el umbral máximo menor calidad de vida.

Tabla 1. Resultado consolidado.

Sexo	Edad	Estrato	Ocupación	Tipo de vivienda	Total prueba OHIP -14
Hombre	77	Estrato 5	Pensionado (a)	Propia	14
Mujer	50	Estrato 2	Desempleado (a)	Familiar	44
Mujer	36	Estrato 2	Ama de casa	Alquilada	12
Mujer	62	Estrato 2	Ama de casa	Alquilada	8
Mujer	77	Estrato 4	Ama de casa	Propia	6
Mujer	51	Estrato 2	Ama de casa	Alquilada	6

Se encontró que ninguno de los pacientes se encuentra en tratamiento de rehabilitación oral, y el 67% NO presenta prótesis extraorales o intraorales que le ayuden a restablecer lo perdido por medio de sustitutos artificiales.

Conclusiones

De los seis pacientes consultados, uno; mujer de 50 años, desempleada, y residente en vivienda de estrato socioeconómico 2, presenta un mayor deterioro de la calidad de vida.

El OHIP -14 aplicado de forma oportuna permite diseñar una estrategia de atención acorde a diversas dimensiones de la salud oral del paciente.

Referencias

- Cáncer oral: genética, prevención, diagnóstico y tratamiento. revisión de la literatura. Mateo-Sidrón Antón M.C., Somacarrera Pérez M.L.. s.l. : Av Odontoestomatol [Internet]. 2015 Ago [citado 2022 Mayo 18] ; 31(4): 247-259
- Chávez Rivera A. C., Choy Zapata. Impacto de la salud oral en la calidad de vida (OHIP 14) en los pacientes que acuden a 2 centros de salud del departamento de Cajamarca en los meses de mayo-agosto de 2019.. Lima - Perú : Universidad Peruana Cayetano Heredia., 2020.
- Ávila Torado Kezen. Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud oral basado en la encuesta OHIP - 14 de las personas con secuelas de ACV que acuden a los servicios de rehabilitación y terapia física de los hospitales del distrito de Chimbote, provincia Del Sant.. s.l. : Universidad Católica Los Angeles Chimbote, 2019.
- García, Martin J, González, Díaz A y García, Pola M. Impacto de la salud oral en la calidad de vida de la gestante. Bogotá - Colombia : Revista de Salud Pública (2017),19(2): 145, 2017.