

| P | C | Diente | clasificación resesión | Etiología resesión | Técnica de cepillado |
|---|---|--------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 1 | 22     | RT2                    | Cepillado          | Horizontal           |
| 1 | 2 | 23     | RT2                    | Cepillado          | Horizontal           |
| 1 | 3 | 24     | RT2                    | Cepillado          | Horizontal           |
| 2 | 4 | 13     | RT2                    | Cepillado          | Horizontal           |
| 3 | 5 | 25     | RT2                    | Cepillado          | Horizontal           |
|   |   |        |                        |                    |                      |

| Signos clínicos Reepitalización |                                  |   |  | Signo |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|-------|
| Márgenes de incisión fusionados | Márgenes de incisión en contacto | Distancia visible entre los márgenes de la incisión | Ausencia de fibrina en los márgenes de la incisión |       |
| 5                               | 0                                | 0   | 2  |       |
| 6                               | 0                                | 0   | 1  |       |
| 6                               | 0                                | 0   | 2  |       |
| 6                               | 0                                | 0   | 2  |       |
| 6                               | 0                                | 0   | 1  |       |
|                                 |                                  |   |  |       |

**8 días**

**Escala EWHS**

| Signos Clínicos Hemostasia                          |   | Signos Clínicos Inflamación                          |  |
|---|---|--|--|
| Presencia de fibrina en los márgenes de la incisión | Sangrado en los márgenes de la incisión | Ausencia de enrojecimiento a lo largo de la incisión | Enrojecimiento en <50% de la longitud de la incisión |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
|   |   |  |  |

|                  |                                 |                                  |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                  |                                 |                                  |
|                  |                                 |                                  |
|                  | Signos clínicos Reepitalizaci   |                                  |
| Escala del dolor | Márgenes de incisión fusionados | Márgenes de incisión en contacto |
| 9                | 4                               | 0                                |
| 9                | 6                               | 0                                |
| 9                | 6                               | 0                                |
| 9                | 6                               | 0                                |
| 9                | 6                               | 0                                |
|                  |                                 |                                  |

**20 días**

**Escala EWHS**

| ión   | Signos Clínicos Hemostasia                         |   |   |
|---|--|---|---|
| Distancia visible entre los márgenes de la incisión | Ausencia de fibrina en los márgenes de la incisión | Presencia de fibrina en los márgenes de la incisión | Sangrado en los márgenes de la incisión |
| 0   | 2  | 0   | 0                                       |
| 0   | 0  | 0   | 0                                       |
| 0   | 2  | 0   | 0                                       |
| 0   | 2  | 0   | 0                                       |
| 0   | 2  | 0   | 0                                       |
|   |  |   |   |

| Signos Clínicos Inflamación                          |  | Escala del dolor | Márgenes de incisión fusionados |
|--|--|------------------|---------------------------------|
| Ausencia de enrojecimiento a lo largo de la incisión | Enrojecimiento en <50% de la longitud de la incisión |                  |                                 |
| 2  | 0  | 8                | 4                               |
| 2  | 0  | 5                | 6                               |
| 1  | 0  | 5                | 6                               |
| 2  | 0  | 5                | 6                               |
| 1  | 0  | 5                | 6                               |
|  |  |                  |                                 |

**30 días**

**Escala EWHS**

Signos clínicos Reepitalización

Signos Clínicos Hemostasia

| Márgenes de incisión en contacto | Distancia visible entre los márgenes de la incisión | Ausencia de fibrina en los márgenes de la incisión | Presencia de fibrina en los márgenes de la incisión |
|----------------------------------|---|--|---|
| 0                                | 0   | 1  | 0   |
| 0                                | 0   | 1  | 0   |
| 0                                | 0   | 2  | 0   |
| 0                                | 0   | 1  | 0   |
| 0                                | 0   | 1  | 0   |
|                                  |   |  |   |

| a                                       | Signos Clínicos Inflamación                          |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| Sangrado en los márgenes de la incisión | Ausencia de enrojecimiento a lo largo de la incisión | Enrojecimiento en <50% de la longitud de la incisión | Escala del dolor |
| 0                                       | 2  | 0  | 2                |
| 0                                       | 2  | 0  | 5                |
| 0                                       | 1  | 0  | 2                |
| 0                                       | 2  | 0  | 2                |
| 0                                       | 2  | 0  | 2                |
|   |  |  |                  |

| Signos clínicos Reepitalización |                                  |   |  | Signos |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--------|
| Márgenes de incisión fusionados | Márgenes de incisión en contacto | Distancia visible entre los márgenes de la incisión | Ausencia de fibrina en los márgenes de la incisión |        |
| 2                               | 0                                | 0   | 2  |        |
| 6                               | 0                                | 0   | 1  |        |
| 6                               | 0                                | 0   | 2  |        |
| 6                               | 0                                | 0   | 1  |        |
| 6                               | 0                                | 0   | 2  |        |
|                                 |                                  |   |  |        |

**90 días**

**Escala EWHS**

| Signos Clínicos Hemostasia                          |   | Signos Clínicos Inflamación                          |  |
|---|---|--|--|
| Presencia de fibrina en los márgenes de la incisión | Sangrado en los márgenes de la incisión | Ausencia de enrojecimiento a lo largo de la incisión | Enrojecimiento en <50% de la longitud de la incisión |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
| 0   | 0                                       | 2  | 0  |
|   |   |  |  |

|                  |
|------------------|
|                  |
|                  |
|                  |
| Escala del dolor |
| 2                |
| 3                |
| 4                |
| 4                |
| 2                |
|                  |