

CASO CLINICO INTERDISCIPLINARIO

INTEGRANTES

MAURICIO CARRILLO

KAREN CHAVEZ

VICTORIA CORREA

CAROLINA GOMEZ

JAIR PATIÑO

PRESENTADO A:

DRA. DIANA GUZMÁN

DRA. NERY VILLOTA

COLEGIO ODONTOLÓGICO COLOMBIANO

BOGOTA D.C., OCTUBRE 2002

CASO CLINICO
INTERDISCIPLINARIO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre: Luz Mendoza Pardo
Edad: 45 años
Sexo: Femenino
Estado civil: Soltera
Escolaridad: Universitaria
Motivo de consulta: "Quiero que me arreglen los dientes que están en la boca"

EXAMEN FÍSICO

Peso: 57 kg
Rh: A+
Estatura: 1.60 mts
Temperatura: 37.2°C
Presión arterial: 120/90 mm/Hg
Frecuencia cardíaca: 69 ppm

ANAMNESIS

Historia médica familiar

No reporta ningún antecedente.

Historia médica personal

No reporta ningún antecedente.

HISTORIA ESTOMATOLOGICA

<i>Dolor músculos masticadores:</i>	No reporta
<i>Dolor ATM:</i>	No reporta
<i>Ruido ATM:</i>	No presenta
<i>Alteración en el movimiento:</i>	No presenta
<i>Desarmonías oclusales:</i>	Si presenta
<i>Hábitos:</i>	No presenta

ANTECEDENTES ODONTOLÓGICOS

<i>Anestesia local:</i>	Sin complicaciones
<i>Anestesia general:</i>	No
<i>Higiene oral:</i>	Buena
<i>Frecuencia de cepillado:</i>	3 veces al día

HISTORIA ESTOMATOLOGICA

<i>Odontalgia:</i>	No presenta
<i>Dolor o ardor en tejidos blandos:</i>	No presenta
<i>Sensibilidad dentaria:</i>	Si presenta
<i>Sangrado gingival:</i>	Si presenta

TRATAMIENTOS RECIBIDOS

Operatoria dental.
Endodoncias.
Cirugía endodóntica.
Prostodoncia.

EXAMEN INTRAORAL

<i>Clasificación de Angle:</i>	No aplicable
<i>Overbite:</i>	No aplicable
<i>Overjet:</i>	No aplicable
<i>Línea media:</i>	Desviación interior 2 mm hacia la izquierda

EXAMEN INTRAORAL

<i>Diastemas:</i>	Entre 33 y 35
<i>Arca edéntula:</i>	Del 35 al 37, 43 al 45, 45 al 47
<i>Malposiciones dentarias:</i>	Rotación distolingual y mesoversión del 35 Mesoversión del 37 y 47

EXAMEN FÍSICO CRANEOMANDIBULAR

<i>Apertura:</i>	55 mm
<i>Protrusión:</i>	No aplicable
<i>Lateralidad izquierda:</i>	No aplicable
<i>Lateralidad derecha:</i>	No aplicable

EXAMEN PERIODONTAL

<i>Labios:</i>	Normales
<i>Carillos:</i>	Normales
<i>Surco vestibular:</i>	Anormal
<i>Gingiva:</i>	Anormal
<i>Reborde alveolar:</i>	Colapsado
<i>Lengua:</i>	Normal

EXAMEN PERIODONTAL

Encía

<i>Color:</i>	Enrojecido
<i>Margen:</i>	Irregular
<i>Consistencia:</i>	Blanda
<i>Textura:</i>	Lisa
<i>Grosor:</i>	Disminuido
<i>Papilas:</i>	Achatadas

EXAMEN PERIODONTAL

<i>Cálculos:</i>	No presenta
<i>Sangrado:</i>	Si presenta
<i>Supuración / exudado:</i>	No presenta
<i>Movilidad:</i>	No presenta

EXAMEN PERIODONTAL

<i>Piso de la boca:</i>	Normal
<i>Frenillos:</i>	Normales
<i>Paladar duro:</i>	Anormal
<i>Paladar blando:</i>	Normal
<i>Amígdalas:</i>	Normales
<i>Glándulas salivares:</i>	Normal

DIAGNOSTICOS

Generales

Paciente sana

Tejidos blandos y óseos

Hemangioma traumático

Candidiasis atrófica

Etiología

Trauma oclusal por prótesis mal adaptado

Cándida Albicans

Periodontales

Periodontitis crónica del adulto leve

Endodonticos

Ninguno

Dentales

Caries activa dientes 35 (C) y 37 (M)

PLAN DE TRATAMIENTO IDEAL

Periodoncia

Terapia básica periodontal

Motivación del paciente

Control placa

Enseñanza de higiene oral y cepillado

Raspaje coronal y profilaxis

Cirugía

Implantes de oseointegración a nivel del 11, 21-12,13-16,26 en maxilar superior y en el inferior a nivel del 36 y 46.

Implantes endoóseos roscados de Ti-Cp 10 mm de longitud x 38 mm diámetro.

Prostodoncia

Prótesis parcial fija del 11 al 16 y del 21 al 26

Inferior → coronas individuales del 36 y 46

Ortodoncia

Ortodoncia correctiva

Etapas de alineación y nivelación

Distalamiento del 43 a 33 (2mm)

Consolidar espacio de canino a canino

Mesializar diente 35

ETAPAS DE RESORTES ABIERTOS DE 35-37 Y 45-47

Retiran los resortes, se colocan arcos rectangulares con anzas en forma de "T" y dobleces de anteinclinación y antirotación.

Mesializar diente 45 con resorte o cadeneta tiempo es de 8 a 10 meses

Retención lingual fija

PLAN DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO

Periodoncia

Terapia básica periodontal

Control placa

Enseñanza de higiene oral y cepillado.

Raspaje coronal y profilaxis

Prostodoncia

Maxilar superior prótesis total

Maxilar inferior prótesis parcial removible

Clasificación de Kennedy III

Límites: 35-37

Modificación

1- 43,45

2- 45,47

Cirugía

No requiere

Endodoncia

No requiere

Operatoria

Resinas vestibulares del 33 y 43

Prostodoncia

Conector mayor: Barra lingual

Apoyos: 37 M, 35 M, 45 M, 47 M

Retenedores 37 y 47 Acker`s simple 35 y 45 semicircunferencial

Plano guía a nivel del diente 43

PLAN DE TRATAMIENTO A REALIZAR

Periodoncia

Terapia básica periodontal

Control placa

Enseñanza de higiene oral y cepillado

Raspaje coronal y profilaxis

Prostodoncia

Prótesis total superior

Prótesis parcial fija del 35-37 y 43-47 RCP

Cirugía

No requiere

Endodoncia

No requiere

Operatoria

Resinas vestibulares del 33 y 43