


REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LAS MADRES EN LA LACTANCIA DE BEBÉS CON LABIO Y PALADAR HENDIDO

AUTORES Velandia L, Álzate C, Morales M.

UNICOC

INTRODUCCIÓN

El labio y paladar hendido es una de las afecciones craneofaciales más frecuentes, con una prevalencia de 1:1.000 nacidos vivos en Colombia. Durante el desarrollo embrionario, varios primordios mediofaciales se fusionan para formar estructuras orofaciales, como la nariz, labio superior y paladar que separa las cavidades oral y nasal.



METODOLOGÍA

Tipo de estudio

Revisión sistemática Cualitativa de literatura.

Tamaño de muestra

De un total de treinta y nueve registros identificados inicialmente, treinta y cuatro permanecieron después de eliminar los duplicados. Sobre la base de un análisis de los títulos y resúmenes, se excluyeron otros veintiséis artículos. Entre los ocho artículos restantes, uno fue excluido después de evaluar su texto completo. Por lo tanto, finalmente se seleccionó una muestra de siete estudios para la síntesis cualitativa

Criterios de Inclusión

1. Artículos científicos que incluyan Madres con bebés de 0 a 24 meses en etapa de lactancia con Labio y paladar hendido.
2. Artículos que describan métodos y estrategias utilizados en la lactancia materna en bebés con LPH
3. Artículos científicos en texto completo
4. Artículos no mayores a 10 años de antigüedad

Criterios de Exclusión

1. Artículos con pacientes que presenten hendiduras diferentes al labio y paladar hendido.
2. Pacientes con intervención quirúrgica previa
3. Pacientes con alimentación artificial
4. Estudios publicados en idiomas distintos al inglés.

DISCUSIÓN

Respecto a la demografía la presente revisión coincide con otros estudios los cuales indican dificultades para la lactancia de pacientes CLP en madres que trabajan.

Se observó la importancia de la asesoría prenatal enfatizando la inclusión dentro de los equipos interdisciplinarios de los consultores de lactancia y adicionalmente la educación no solo a las madres si no a los profesionales de la salud.

Todos los estudios evidenciaron desafíos de las madres para la lactancia de niños CLP, como ansiedad, estrés, frustración y esto coincide con estudios como Henderson que lo asociaron depresión post parto.

BIBLIOGRAFÍA

1. Vyas T, Gupta P, Kumar S, Gupta R, Gupta T, Singh HP. Cleft of lip and palate: A review. J Family Med Prim Care. 2020;9(6):2621.
2. Aguirre-Raya KA, Castilla-Peón MF, Barajas-Nava LA, Torres-Rodríguez V, Muñoz-Hernández O, Garduño-Espinoza J. Self-perception and knowledge of evidence based medicine by physicians. BMC Med Educ. 2016 Jun 29;16(1):166.
3. Isaza C, Manrique LA. Anomalías y síndromes asociados con labio y/o paladar hendido. Colomb Med. 2016 Sep 7;22(2):55-61.
4. Yu Y, Jia, Yao J. min. Classification of Cleft Lip and Palate. In: Yao Jian-min; Xuling-hong, editor. Atlas of Cleft Lip and Palate & Facial Deformity Surgery. Hangzhou: Springer, Singapore; 2020. p. 3-16.
5. Vyas T, Gupta P, Kumar S, Gupta R, Gupta T, Singh HP. Cleft of lip and palate: A review. J Family Med Prim Care. 2020;9(6):2625.
6. Lotfallah MA, Shahidi MS, Odelberg DSW, Darr MA. Cleft lip and palate. InnovAIT. 2023 Jan 18;16(4):165-70.

OBJETIVO

Sintetizar los hallazgos de la investigación existente sobre la experiencia de lactancia materna de las madres de bebés con labio y paladar hendido y evaluar sus percepciones sobre las dificultades y factores facilitadores encontrados durante el proceso.

RESULTADOS

Identificación
Evaluados
Elegibilidad
Incluidos

Número de registros identificados mediante búsquedas en bases de datos
(n= 39)

Nº de artículo potencialmente relevante identificados y recuperados
(n = 39)

Número de registros duplicados (n=5)

N.º de registros evaluados por título y abstracto (n = 34)

Número de registros excluidos (n=26)

Nº de artículos de texto completo evaluados para su elegibilidad
(n=8)

Número de artículos de texto completo excluidos(n=1)

Número de estudios incluidos en la síntesis cualitativa
(n = 7)

Diagrama de Flujo de la estrategia de búsqueda según PRISMA

Autores y año de publicación	Mathison et al 2020	Kaye et al 2019	Murphy et al 2020	Adelstein AA et al, 2020, Nigeria.	Lindberg et al, 2014, Noruega.	Zapata C et al, 2022, Colombia.	Kanungwiro et al, 2020, Tanzania.
Pregunta CASP	Si	No se puede decir	No	Si	No se puede decir	No	Si
¿Están claros los objetivos?	*	*	*	*	*	*	*
¿Se ha mencionado cuáles métodos?	*	*	*	*	*	*	*
¿El diseño de la investigación es apropiado para abordar los objetivos de la investigación?	*	*	*	*	*	*	*
¿La estrategia de reclutamiento fue apropiada para los objetivos de la investigación?	*	*	*	*	*	*	*
¿El método de recolección de datos aborda el tema de investigación?	*	*	*	*	*	*	*
¿Se ha tenido en cuenta la relación entre el investigador y los participantes?	*	*	*	*	*	*	*
¿Se han tenido en cuenta las cuestiones éticas?	*	*	*	*	*	*	*
¿Se han suficientemente rigurosos análisis de los datos?	*	*	*	*	*	*	*

Tabla Evaluación CASP

CONCLUSIONES

- La revisión de estudios cualitativos permite contar con información directa de las experiencias de las madres de bebés con CPL y comprender las dificultades que enfrentan, así como los mecanismos facilitadores que podrían tenerse en cuenta al momento de dirigir recursos y esfuerzos para mejorar la nutrición de esta población.
- La variedad en los estudios seleccionados permitió identificar que la mayoría de las madres de bebés con CPL refieren enfrentarse a información contradictoria con respecto a la lactancia materna por parte del personal de salud. A algunas madres se les desaconseja del todo la práctica de lactancia materna a sus bebés y se sugiere la educación no solo a las madres sino al personal de salud que trata a estos pacientes.